



para niños

# Chamodent®

## Comprimidos

Medicamento homeopático



Schwabe Farma  
Ibérica S.A.U.

**Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para Vd.** Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, usted debe utilizar con cuidado **Chamodent®** para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 2 o 3 días de tratamiento, debe consultar a su médico o farmacéutico.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

### **En este prospecto se explica:**

1. Qué es **Chamodent®** y para qué se utiliza.
2. Antes de tomar **Chamodent®**
3. Cómo tomar **Chamodent®**
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de **Chamodent®**
6. Información adicional

### **1. QUÉ ES Chamodent® Y PARA QUÉ SE UTILIZA:**

Son comprimidos homeopáticos de 100 mg.

**Chamodent®** es un medicamento homeopático indicado para el alivio de los síntomas que aparecen en la erupción y desarrollo de los dientes.

**Chamodent®** es un medicamento homeopático que alivia los síntomas típicos de la dentición, tales como salivación intensa, temperatura aumentada, mejillas rojas, inquietud, sueño alterado, apetencia alterada y diarrea. **Chamodent®** mejora el bienestar del bebé.

### **2. ANTES DE TOMAR Chamodent®:**

**No tome Chamodent® en los siguientes casos:**

Si usted tiene hipersensibilidad a alguno de los componentes de la especialidad.

**Tenga especial cuidado con Chamodent®, ya que:**

En caso de una agravación de los síntomas, fiebre alta o si no se instaurase una mejoría después de 2 ó 3 días de tratamiento, consulte a su médico.

**Toma de Chamodent® con alimentos y bebidas:**

No se recomienda tomar **Chamodent®** junto con las comidas. Se recomienda tomar los comprimidos media hora antes o después de las comidas.

**Embarazo y Lactancia:**

No está dirigido a esta población.

**Información importante sobre alguno de los componentes de Chamodent®:**

Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que su niño padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

**Uso de otros medicamentos:**

No se han observado interacciones con otros medicamentos. Informe a su médico o farmacéutico si el niño está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

### **3. CÓMO TOMAR Chamodent®:**

***Este medicamento se utiliza por vía oral.***

*Fase aguda:* 1 comprimido cada 1-2 horas (máximo 6 comprimidos al día).

*A partir de la mejoría:* 1-3 comprimidos al día, mientras persistan los síntomas.

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras distintas.

Recuerde tomar su medicamento.

Si estima que la acción de **Chamodent®** es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

#### ***Instrucciones para el correcto uso del preparado:***

Los comprimidos deben disolverse en la boca. En caso de niños pequeños pueden disolverse en un poco de agua.

#### ***Si usted toma más Chamodent® del que debiera:***

En caso de sobredosis o ingestión accidental de grandes cantidades no se esperan efectos adversos. En caso de sobredosis consulte al Servicio de Información Toxicológica tel.: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

#### ***Si olvidó tomar Chamodent®:***

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

### **4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS:**

Como todos los medicamentos, **Chamodent®** puede tener efectos adversos.

No se conocen efectos adversos hasta la fecha.

Si observa cualquier reacción adversa no descrita en este prospecto, consulte a su médico o farmacéutico.

El uso de medicamentos homeopáticos puede temporalmente aumentar los síntomas existentes (agravación inicial). En estos casos interrumpa el tratamiento y consulte con su médico o farmacéutico.

### **5. CONSERVACIÓN DE Chamodent®:**

No utilizar **Chamodent®** después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de Cad.: La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Conservar protegido de la humedad en el envase original.

#### ***Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.***

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

### **6. INFORMACIÓN ADICIONAL:**

#### ***Composición de Chamodent® comprimidos de 100 mg:***

Cada comprimido contiene, como principios activos: Belladonna D6 15 mg, Chamomilla D6 15 mg, Ferrum phosphoricum D6 15 mg, Hepar sulfuris D12 15 mg, Pulsatilla D6 15 mg.

Los demás componentes son lactosa, celulosa microcristalina, talco y estearato de magnesio.

#### ***Aspecto del producto y contenido del envase:***

**Chamodent®** se presenta en frasco de vidrio con tapón de plástico.

Cada frasco de **Chamodent®** contiene 120 comprimidos de 100 mg de color blanco.

#### ***Titular y responsable de la fabricación:***

Schwabe Farma Ibérica S.A.U.

Avenida de la Industria, 4.

Edificio 2, escalera 1, 2ª planta

28108 Alcobendas

(Madrid)

**Texto revisado:** Junio 2013.