

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para Vd. Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, usted debe utilizar con cuidado Colikind® para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 2 o 3 días de tratamiento, debe consultar a su médico o farmacéutico.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

En este prospecto se explica:

1. Qué es Colikind® y para qué se utiliza.
2. Antes de tomar Colikind®
3. Cómo tomar Colikind®
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Colikind®
6. Información adicional

1. QUÉ ES Colikind® Y PARA QUÉ SE UTILIZA:

Son gránulos homeopáticos.

Colikind® es un medicamento homeopático indicado para el cólico del lactante.

Colikind® es un medicamento homeopático cuyos componentes poseen una acción carminativa, tranquilizante y analgésica. Este medicamento favorece la expulsión de los gases y mejora la sintomatología asociada al cólico del lactante.

2. ANTES DE TOMAR Colikind®:

No tome Colikind® en los siguientes casos:

Si usted tiene hipersensibilidad a alguno de los componentes de la especialidad.

Tenga especial cuidado con Colikind®, ya que:

En caso de una agravación de los síntomas o si no se instaurase una mejoría después de 2 o 3 días de tratamiento, consulte a su médico.

En niños menores de 3 meses, en caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Toma de Colikind® con alimentos y bebidas:

No se recomienda tomar Colikind® junto con las comidas. Se recomienda tomar los gránulos 20 minutos antes de la lactación.

Embarazo y Lactancia:

No está dirigido a esta población.

Uso de otros medicamentos:

No se han observado interacciones con otros medicamentos. Informe a su médico o farmacéutico si el niño está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

3. CÓMO TOMAR Colikind®:

Este medicamento se utiliza por vía oral.

Lactantes:

Salvo distinto criterio facultativo, administrar 5 gránulos antes de cada lactación y espaciar las tomas según mejoría hasta la desaparición de los síntomas.

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras distintas.

Recuerde tomar su medicamento.

Si estima que la acción de Colikind® es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Instrucciones para el correcto uso del preparado:



Retirar el precinto de seguridad e invertir el envase.

Girar el dosificador hasta obtener el número deseado de gránulos.

A continuación, separar el receptáculo y verter los gránulos en la boca o bien deshacerlos en un poco de agua en un biberón o en una cucharita.

Si usted toma más Colikind® del que debiera:

En caso de sobredosis o ingestión accidental de grandes cantidades no se esperan efectos adversos. En caso de sobredosis consulte al Servicio de Información Toxicológica tel.: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar Colikind®:

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS:

Como todos los medicamentos, Colikind® puede tener efectos adversos.

No se conocen efectos adversos hasta la fecha.

Si observa ésta o cualquier otra reacción adversa no descrita en este prospecto, consulte a su médico o farmacéutico.

El uso de medicamentos homeopáticos puede temporalmente aumentar los síntomas existentes (agravación inicial). En estos casos interrumpa el tratamiento y consulte con su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE Colikind®:

No utilizar Colikind® después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de Cad.: La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Conservar por debajo de 25°C.

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Composición de Colikind® gránulos:

Cada 10 g de gránulos contienen, como principios activos:

Argentum nitricum D8 14,3 mg, Chamomilla D1 14,3 mg, China D3 14,3 mg, Cuprum aceticum D8 14,3 mg, Lycopodium D3 14,3 mg, Momordica balsamina D4 14,3 mg, Tilia europaea D1 14,3 mg.

Los demás componentes son xilitol.

Aspecto del producto y contenido del envase:

Colikind® se presenta en frasco de vidrio con tapón dosificador de plástico.

Cada frasco de Colikind® contiene 10 gramos de gránulos de color blanco.

Titular y responsable de la fabricación:

Schwabe Farma Ibérica S.A.U.

Avenida de la Industria, 4.

Edificio 2, escalera 1, 2ª planta

28108 Alcobendas

(Madrid)

Texto revisado: Junio 2015.